

Zwalczane chwasty	Nazwa handlowa środka	Substancja czynna (zawartość)	Grupa chemiczna (klasyfikacja HRAC)	Dawka na ha					
Perz właściwy, chwasty jednoliścienne (chwasty prosoвате) oraz niektóre chwasty dwuliścienne	Contor 25 WG + Helm Surfer Plus	rimsulfuron (250 g/l) + adiuwant	pochodne sulfonilomocznika (B)	50 g + adiuwant 0,2 l					
	Radar + Helm Surfer Plus	rimsulfuron (250 g/l) + adiuwant	pochodne sulfonilomocznika (B)	50 g + adiuwant 0,2 l					
	Rimel 25 SG + Asystent + IP	rimsulfuron (250 g/l) + adiuwant	pochodne sulfonilomocznika (B)	60 g + 0,05–0,1 l					
	Rincon 25 SG + Asystent + IP	rimsulfuron (250 g/l) + adiuwant	pochodne sulfonilomocznika (B)	60 g + 0,05–0,1 l					
<b>PO WSCHODACH, GDY ROŚLINY OSIĄGNĘŁY WYSOKOŚĆ 13–15 CM, PRZED ZAKRYCIEM MIĘDZYRZĘDZI (BBCH 12–33)</b>					<b>PO WSCHODACH, GDY ROŚLINY OSIĄGNĘŁY WYSOKOŚĆ 13–15 CM, PRZED ZAKRYCIEM MIĘDZYRZĘDZI (BBCH 12–33)</b>				
Chwasty jednoliścienne	Centurion Plus	kletodym (120 g/l)	cykloheksanodiony (A)	0,8–2,0 l					
	Select Super 120 EC	kletodym (120 g/l)	cykloheksanodiony (A)	0,8–2,0 l					
<b>PIERWSZA PARA LIŚCI – POCZĄTEK ZAWIĄZYWANIA BULW, PO ZAKOŃCZENIU UPRAWY MIĘDZYRZĘDOWEJ PRZED ZAKRYCIEM MIĘDZYRZĘDZI (BBCH 12–40)</b>					<b>PIERWSZA PARA LIŚCI – POCZĄTEK ZAWIĄZYWANIA BULW, PO ZAKOŃCZENIU UPRAWY MIĘDZYRZĘDOWEJ PRZED ZAKRYCIEM MIĘDZYRZĘDZI (BBCH 12–40)</b>				
Chwasty jednoliścienne	Fusilade Forte 150 EC IP	fluazyfop-P-butylowy (125 g/l)	arylofenoksykwasy (A)	1,0–1,7 l					W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4–6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3–4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwanie międzyrzędzi
	Privium 125 EC IP	fluazyfop-P-butylowy (125 g/l)	arylofenoksykwasy (A)	0,75–2,0 l					
	Trivko IP	fluazyfop-P-butylowy (125 g/l)	arylofenoksykwasy (A)	0,5–2,0 l					
<b>GDY ROŚLINY ZIEMNIKA OSIĄGNĘŁY 10–15 CM (BBCH 15–17)</b>					<b>GDY ROŚLINY ZIEMNIKA OSIĄGNĘŁY 10–15 CM (BBCH 15–17)</b>				
Chwasty dwuliścienne	Basagran 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Benta 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Bentaz 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Bentazon 480 SI IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Gransol 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Wolof A 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Wolof B 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
	Wolof C 480 SL IP	bentazon (480 g/l)	diazyny (C3)	3,0 l					W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
<b>DZIEWIĄTY LIŚĆ (POWYŻEJ 10 CM) – POCZĄTEK WYDŁUŻANIA GŁÓWNEJ ŁODYGI (POWYŻEJ 20 CM) (BBCH 20–30)</b>					<b>DZIEWIĄTY LIŚĆ (POWYŻEJ 10 CM) – POCZĄTEK WYDŁUŻANIA GŁÓWNEJ ŁODYGI (POWYŻEJ 20 CM) (BBCH 20–30)</b>				
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Plaza 25 WG + Pottok IP	rimsulfuron (250 g/kg)	pochodne sulfonilomocznika (B)	50 g + 0,2 l					Środek można stosować w systemie dawek dzielonych. Pierwszy zabieg: Plaza 25 WG 20 g/ha + Pottok 0,2 l/ha. Drugi zabieg: 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, Plaza 25 WG 30 g/ha + Pottok 0,2 l/ha
	Contor 25 WG + Helm Surfer Plus IP	rimsulfuron (250 g/kg)	pochodne sulfonilomocznika (B)	50 g + 0,2 l					Środek można stosować w systemie dawek dzielonych. Pierwszy zabieg: Contor 25 WG 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Drugi zabieg: 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, Contor 25 WG 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha

Informacja o zwalczanych gatunkach chwastów znajduje się w etykiecie środka ochrony roślin

						Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Termin ważności zezwolenia	Uwagi
						1	ND	2021.04.30	Środek można stosować w dawkach dzielonych. I zabieg: 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Środek stosować w fazie rozwinięcia dziewiątego liścia (powyżej 10 cm wysokości) (BBCH 20). II zabieg: 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Stosować po upływie 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, do początku wydłużania głównej łodygi (poniżej 20 cm wysokości) (do BBCH 30)
						1	ND	2021.04.30	Środek można stosować w dawkach dzielonych. I zabieg: 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Środek stosować w fazie rozwinięcia dziewiątego liścia (powyżej 10 cm wysokości) (BBCH 20). II zabieg: 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Stosować po upływie 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, do początku wydłużania głównej łodygi (poniżej 20 cm wysokości) (do BBCH 30)
						1	ND	2021.04.30	
						1	ND	2021.04.30	
						1	56	2022.05.31	
						1	56	2023.06.03	
						1	90	2025.12.11	W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4–6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3–4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwanie międzyrzędzi
						1	90	2022.12.31	
						1	90	2025.12.11	
						1	ND	2020.01.08	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
						1	ND	2020.01.08	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
						1	ND	2020.01.08	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
						1	ND	2020.01.08	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
						1	ND	2020.01.08	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
						1	ND	2020.01.08	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG: 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25–0,3 kg/ha
						1	ND	2021.04.30	Środek można stosować w systemie dawek dzielonych. Pierwszy zabieg: Plaza 25 WG 20 g/ha + Pottok 0,2 l/ha. Drugi zabieg: 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, Plaza 25 WG 30 g/ha + Pottok 0,2 l/ha
						1	ND	2021.04.30	Środek można stosować w systemie dawek dzielonych. Pierwszy zabieg: Contor 25 WG 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha. Drugi zabieg: 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu, Contor 25 WG 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha

Podstawą wykonania zabiegu są informacje zawarte w etykiecie środka ochrony roślin

